

# POTASYUM ÇÖZELTİSİ SMART-K

Garanti Edilen İçerik (w/w)

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K<sub>2</sub>O) : % 30

		YAPRAK UYGULAMASI
	Kullanım Dozu	Uygulama Zamanı
Domates, Biber, Patlıcan	200-400 cc/da	Meyve tutumundan sonra 20 gün aralıklarla hasat sonuna kadar 3-4 uygulama
Hıyar, Karpuz, Kavun, Kabak	300-400 cc/da	Kolatımında, meyve tutumunda ve bundan sonra 20 gün aralıklarla
Patates, Soğan, Ispanak, Marul, Havuç, Maydanoz, Lahana, Karnabahar, Şeker Pancarı	200-250 cc/da	Bitkiler 3-4 yapraklı olduktan sonra 20 gün aralıklarla
Fasulye, Bezelye, Bakla	200-250 cc/da	Meyve tutumundan sonra 2 uygulama
Narenciye, Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt	300-500 cc/100 lt.suya	Meyve tutumundan sonra 2 uygulama
Elma, Armut, Ayva, Kayısı, Zeytin, Şeftali, Kiraz, Vişne, Badem, Erik	300-500 cc/100 lt.suya	Meyve tutumundan sonra ve 20-30 gün aralıklarla 2-3 uygulama
Çilek	400-500 cc/da	Çiçeklenmeden sonra 15-20 günlük aralıklarla 3 uygulama
Bağ	200-400 cc/100 lt.suya	Dane tutumu zamanı 2 uygulama
Muz	400-600 cc/da	Erken ilkbahardan itibaren 20-30 gün aralıklarla
Buğday, Arpa, Çelik	200-250 cc/da	Kardeşlenme, sapa kalkma döneminde
Mısır	200-250 cc/da	Bitkiler 20-30 cm boyda ve 8-10 yapraklı iken başlanıp hasata kadar
Pamuk	300-400 cc/da	Koza oluşumundan sonra 2 uygulama
Ayçiçeği	200-300 cc/da	Bitkiler 3-5 yapraklı olunca ve 20-25 gün aralıklarla
Süs Bitkileri	100-250 cc/da	Vegetasyon boyunca 15-20 gün aralıklarla
Yeşil Alanlar	100-250 cc/da	İlkbahardan itibaren 20-30 gün aralıklarla

Damlama sulama sistemlerinden uygulandığında yukarıda belirtilen gelişim dönemlerinde **Smart - K** 2-3Lt/da dozunda kullanılır.

## UYARILAR :

- Kuvvetli alkalin ve bordo bulamaçları dışındaki ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir.
- Kullandıktan sonra elinizi yıkayınız.
- Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.
- Orijinal ambalajında kapağı kapalı olarak güvenli bir yerde saklayınız. üretici firma ürünün yanlış kullanılmasından doğacak zarardan sorumlu değildir.
- Gübreleme işlemi güneş etkisinin az olduğu sabah erken ve akşam geç saatlerde yapılmalıdır.
- Depolama sıcaklığı 0° C ile +40° C arasında olmalıdır.
- Yaprak gübrelemesi ile ulaşılabilecek sonuçlar ve mahsul miktarı, toprak, iklim v.b. gibi birden fazla faktör tarafından etkilenir. Bu sebeple önce yaprak ve toprak analizi yaptırılması, elde edilen analiz sonuçlarına göre gübreleme yapılması önerilmektedir.

Bakanlık Tescil No  
Bakanlık Lisans No

Son Kullanım Tarihi  
Parti Seri No

Net Ağırlık  
Üretim İzni:

## ÜRETİCİ FİRMA

FERTİKİM TARIM KİMYA MAK. SAN. VE TİC. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Kâzım Karabekir Cad. No:53

Ulucak Kemalpaşa - İZMİR

Tel: 0232 873 46 64 Fax : 873 44 55

e-mail : info@fertikim.com www.fertikim.com



Piyasaya Sunacağımız Ürün Üzerindeki Etiket Bilgisinin Aynısının Olacağını Taahhüt Eder Aksinin Tespiti Halinde 4703 Sayılı Kanuna Göre Hakkımızda Yapılacak Cezai İşlemleri Peşinen Kabul Ederiz.

Sebahat ULUŞAN  
Ziraat Mühendisi

**FERTİKİM**  
TARIM KİMYA MAK. SAN. VE TİC. A.Ş.  
Cumhuriyet Mah. Kâzım Karabekir Cad. No:53  
Ulucak Kemalpaşa / İZMİR  
Tel: 0232 873 46 64  
Fax: 0232 873 44 55