

24287

**EC FERTILIZER**  
**NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ**  
**MAXI-K-60**  
**10-5-40+TE**

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Toplam Azot (N)	: % 10
Nitrat Azotu (N)	: % 8
Amonyum Azotu (N)	: % 2
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)	: % 5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	: % 40
Suda Çözünür Bakır (Cu)	: %0,02
Suda Çözünür Demir (Fe)	: %0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn)	: %0,01
Suda Çözünür Çinko (Zn)	: %0,02

BİTKİLER	UYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANLARI(yapraktan uygulama)	UYGULAMA DOZU
<b>SEBZELER</b>		
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak, Fasulye, Bezelye	ilk gelişme devresinde kök gelişimi ve bitki büyümesini teşvik amacıyla başlanır. Çiçeklenme döneminden itibaren devam edilir. 1015 gün ara ile 3-4 uygulama yapılır.	250-300 gr/da.
Marul, ıspanak, lahan, maydanoz, Kamıbahar	Gelişmenin erken devrelerinde başlanır. İleri dönemde 15 gün arayla devam edilir.	250-300 gr/da.
Havuç, Soğan, Sarımsak	Gelişmenin erken devrelerinde 15 gün arayla 2-3 uygulama yapılır.	200-300 gr/da.
Patates	Gelişmenin erken devrelerinde 2-3 hafta arayla 2-3 uygulama yapılır.	300-400 gr/da.
<b>HUBUBAT (YAPRAKTAN)</b>		
Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf	Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemlerinde uygulanır.	250-300 gr/da.
<b>ENDÜSTRİ BİTKİLERİ</b>		
Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Mısır, Mercimek, Enginar	Pamukta bitkiler 4-5 yapraklı olunca kullanılmaya başlanır, konaklama döneminde devam edilir. Diğer bitkiler için gelişme dönemi boyunca 34 uygulama yapılır.	250-350 gr/da.
Tütün	Fide yastıklarına 100 lt. Suya 150-200 gr ilave edilerek hazırlanan solüsyon verilir.	200-250 gr/100lt.
Fındık	Bahar Döneminde başlayarak bir sezonda 2-3 uygulama	350-400 gr/100lt.
Şeker Pancarı	Bitkilere 4-6 yaprak döneminde başlayıp 15 gün arayla 3 uygulama yapılır.	350-450 gr/da.
<b>MEYVELER</b>		
Narenciye Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt vs. Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz	Sürgün faaliyeti başlayıp 2 hafta ara ile 2-3 uygulama yapılır.	350-400 gr/100lt.
Bağ	Gelişmenin erken döneminde çiçeklenmeden önce ilk meyve tutumundan sonra ikinci ve bundan 15 gün sonra 3. uygulama yapılır.	300-350 gr/100lt.
Çilek	Fide dikiminden itibaren 15-20 günlük aralıklarla 2-3 uygulama	300-350 gr/100lt.
Muz	Çiçeklenme döneminden başlayıp 7-10 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.	400-500 gr/100lt.
Zeytin	Yetiştirme süresi boyunca 3-4 uygulama yapılır	200 gr/100lt.
Süs Bitkisi	İki haftada bir uygulama yapılır.	75-100 gr/100lt.
Çimenler	Yaz dönemi boyunca ayda bir uygulama	100-150 gr/100lt.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- Kuvvetli alkalın ve bordo bulamacı dışındaki ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir.
- Çiçeklenme döneminde püskürtülerek yapılacak ilaçlama ve gübrelemenin zarar verme olasılığı göz önünde tutulmalıdır.
- Üretici firma ürünün yanlış kullanılmasından doğacak zarardan sorumlu değildir.
- Kullandıktan sonra elinizi yıkayınız.
- Göz ile temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız
- Orijinal ambalajında 0 °C +40°C arasındaki sıcaklıkta güneş almayan kapalı ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
- Gübreleme işlemi güneş etkisinin az olduğu sabah erken ve akşam geç saatlerde yapılmalıdır.
- Yutmayınız, teneffüs etmeyiniz. Yutulması halinde doktora başvurunuz.

\*\*\* **Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.**

Pembe renkte ve Kristal Yapıdadır.

Seri No:                      Son Kullanma Tarihi:  
Net Ağırlık                      Üretim Tarihi:

Bakanlık Lisans No:

Bakanlık Tescil No:

**ÜRETİCİ FİRMA:**

**FERTİKİM TARIM KİMYA MAKİNE SAN. VE TİC.A.Ş.**  
Cumhuriyet Mah. Kâzım Karabekir Cad. No:53  
Ulucak - Kemalpaşa - İZMİR  
Tel: 0232 873 46 64 Fax: 0232 873 44 55  
www.fertikim.com      e-mail: info@fertikim.com



Piyasaya Sunacağımız Ürün Üzerindeki Etiket Bilgisinin Aynısının Olacağını Taahhüt eder Aksinin Tespiti Halinde 4703 Sayılı Kanuna Göre Hakkımızda Yapılacak Cezayı İşlemcileri Peşinen Kabul Ederiz.

**FERTİKİM**  
TARIM KİMYA MAKİNE SAN. VE TİC.A.Ş.  
Cumhuriyet Mah. Kâzım Karabekir Cad. No:53  
Ulucak - Kemalpaşa - İZMİR  
Tel: 0232 873 46 64  
Kemalpaşa V.D.388 015 3412

**Sebahat ULUŞAN**