

ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLER
SIVI HALDEKİ HÜMİK ASİT
ROYAL STRONG UP

Garanti Edilen İçerik % (w/w)	
Organik Madde	: % 8
HUMİK ASİT + FULVİK ASİT	: % 15
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K ₂ O)	: % 1.5
Ph	: 10-12



BİTKİLER	UYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANLARI	UYGULAMA DOZU	
		Topraktan cc/dekar	Yapraktan cc/100lt su
SEBZELER			
Domates Biber, Patlıcan	Dikimden 10-15 gün sonra başlayarak 20 gün aralıklarla hasat sonuna kadar	500-700 cc	200 cc
Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak	Kol atımında, meyve tutumunda ve bundan sonra 20 gün aralıklarla	500-700 cc	200-250 cc
Patates, Soğan, Marul, Ispanak, Havuç, Maydonoz, Lahana, Karnabahar, Şeker Pancarı	Bitkiler 2-3 yapraklı olduktan sonra 20 gün aralıklarla	500-700 cc	200-300 cc
Fasulye, Bezelye, Bakla	Bitkiler 5-10 cm olduktan sonra çiçeklenme dönemine kadar 15 gün hasat sonuna kadar 20 gün aralıklarla	500 cc	200-300 cc
Kültür Mantarı	Örtü toprağının kullanılmasından sonra		1000 cc
MEYVELER			
Narenciye, Portakal, Limon, Mandalin v.s.	Yeni göz ve yaprak oluşumundan itibaren 20 günlük aralıklarla	500-800 cc	200-300 cc
Elma, Armut, Ayva, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Vişne, Badem, Zeytin	Çiçeklenmeden önce, meyve tutumundan sonra ve 20-30 günlük aralıklarla 100 cc/ağaç		500-800cc
Çilek	Vegasyon başından itibaren 15-20 günlük aralıklarla	500-700 cc	200-300 cc
Bağ	Sürgünler 10-15 cm olunca çiçeklenme öncesi, dane tutumu ve gelişmesi boyunca	700-900 cc	200-300 cc
Muz	Erken ilkbahardan itibaren 20-30 günlük aralıklarla	1000-2000 cc	
TARLA BİTKİLERİ			
Buğday, Arpa, Çelik	Kardeşlenme, sapa kalkma ve başaklanma döneminde	500-700 cc	250-350 cc
Mısır	Ekimden önce veya Bitkiler 10-15 cm boyunda ve 8-10 yapraklı iken başlayıp hasat öncesine kadar	800-1000 cc	250-350 cc
Tütün	İlk dikimden 10 gün sonra 15-20 günlük aralıklarla, 3 kez uygulanır		250-300 cc
Pamuk	3-5 yapraklı olunca çiçek öncesi koza oluşumunda ve sonrasında 20-25 gün aralıklarla	500-700 cc	250-400 cc
Ayçiçeği	Bitkiler 3-5 yapraklı olunca ve 20-25 gün aralıklarla	500-700 cc	250-350 cc
Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı	Bitkiler 10-15 cm olduktan sonra 20-25 gün aralıklarla	500-700 cc	250-300 cc
YEM BİTKİLERİ			
Tek Yıllıklar (Fıç)	Çıkiştan 3-4 hafta sonra 20-30 gün aralıklarla	1000 cc	250-300 cc
Yonca, Korunga	Çiçeklenmeden sonra, baharda, her biçimden sonra ve 20-25 gün aralıklarla	800-1000 cc	250-350 cc
SÜS BİTKİLERİ			
Süs Bitkisi	Vegasyon boyunca 15-20 günlük aralıklarla	800-1000 cc	250-350 cc
Süs Bitkileri Çelikleri	Çeliklerin dip kısımları 1-24 saat Strong Up'lı suyla ıslatılır		400-1000 cc
YEŞİL ALANLAR/ÇİM			
Fidelerde *	Ekim öncesi viollere ve çimlenmeden sonra 1-2 yapraklı iken 15-20 gün aralıklarla 2 kez uygulanır	400-500 cc	200-250 cc
Tohum Uygulanması	Küçük tohumlarda 700-900 cc/100 kg Büyük tohumlarda 400-500cc/100 Kg		

(*) Ayrıca fidelerin şaşırtılmasında ve esas dikimden önce tavsiyemiz 100 lt. suya 400-500 cc STRONG UP ile birlikte uygun bir fungusla hazırlanan eriyiğe barındırıp dikilmelidir

KARIŞABİLME ÖZELLİĞİ : Genel olarak birçok tarım ilacı, yaprak gübreleri, bitki gelişim düzenleyicileri ile karıştırılabilir

Ph'sı 6'dan küçük ilaçlarla karıştırmaktan kaçınınız.

KULLANIM ŞEKLİ : Gerekli miktarda Strong Up başka bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılarak aletin deposuna aktarılır. Daha sonra tank suyu ile tamamlanır ve karıştırılıp püskürtülür. Ayrıca Strong Up damlama sulama sistemi veya salma sulama tabandan verilir.

STRONG UP suda homojen dağılan, yüksek kaliteli sıvı humik asittir. Yumruklu bitkiler, soğan, sarımsak v.b. ürünler başta olmak üzere her türlü üründe kullanılabilir. Kullanıldığı ürünlerde verim ve kaliteyi yükseltir.

KULLANILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Uygulama esnasında koruma uyarılarına uyunuz.
- Kullanıcı, imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır
- İmalatçi ürünün uygun olmayan şartlarda muhafaza veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

DEPOLAMA DURUMU

- Kendi orijinal ambalajında muhafaza ediniz.
- Ağız kapalı olarak gıda maddelerinden uzak, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği, doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmayan serin ve kuru ortamda depolanmalıdır.

DİKKAT : KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ.

Bakanlık Tescil No :
Bakanlık Lisans No :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Net :

ÜRETİCİ FİRMA
FERTİKİM TARIM KİMYA MAK.SAN.VE TİC.A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Kâzım Karabekir Cad. No:53
Ulucak Kemalpaşa / İZMİR
Tel: 0232 873 46 64 Fax: 0232 873 44 55
e-mail: info@fertikim.com - www.fertikim.com

FERTİKİM
TARIM KİMYA MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Kâzım Karabekir Cad. No:53
Ulucak - Kemalpaşa / İZMİR
Tel: (0 232) 873 46 64
Kemalpaşa V. D. 385 015 3412

Piyasaya Sunacağımız Ürün Üzerindeki Etiket Bilgisinin Aynısının Olacağını Taahhüt eder Aksinin Tespti Halinde 4703 Sayılı Kanuna Göre Hakkımızda Yapılacak Ceza İşlemleri Peşinen Kabul Ederiz.

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi