

**EC FERTİLİZER**  
**POTASYUM SÜLFAT**  
**POTASSE 50**

**Garanti Edilen İçerik (w/w)**  
**Suda Çözünür Potasyum Oksit (K<sub>2</sub>O) : %50**

BİTKİLER	UYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANLARI (YAPRAKTAN)	UYGULAMA DOZU
<b>SEBZELER</b>		
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak, Fasulye, Bezelye	İlk gelişme devresinde kök gelişimi ve bitki büyümesini teşvik amacıyla başlanır. Çiçeklenme döneminden itibaren devam edilir. 1015 gün ara ile 3-4 uygulama yapılır.	350-400 gr/da.
Marul, Ispanak, Lahana, Maydonoz, Karnıbahar	Gelişmenin erken devrelerinde başlanır. İleri dönemde 15 gün arayla devam edilir.	300-350 gr/da.
Havuç, Soğan, Sarımsak	Gelişmenin erken devrelerinde 15 gün arayla 2-3 uygulama yapılır.	250-300 gr/da.
Patates	Gelişmenin erken devrelerinde 2-3 hafta arayla 2-3 uygulama yapılır.	400-500 gr/da.
<b>HUBUBAT (YAPRAKTAN)</b>		
Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf	Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemlerinde uygulanır.	200-250 gr/da.
<b>ENDÜSTRİ BİTKİLERİ</b>		
Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Mısır, Mercimek, Enginar	Pamukta bitkiler 4-5 yapraklı olunca kullanılmaya başlanır, konaklama döneminde devam edilir. Diğer bitkiler için gelişme dönemi boyunca 34 uygulama yapılır.	250-350 gr/da.
Tütün	Fide yastıklarına 100 lt. Suya 150-200 gr ilave edilerek hazırlanan solüsyon verilir.	350-450 gr/100lt.
Fındık	Bahar Döneminde başlayarak bir sezonda 2-3 uygulama	450-550 gr/100lt.
Şeker Pancarı	Bitkilere 4-6 yaprak döneminde başlayıp 15 gün arayla 3 uygulama yapılır.	400-600 gr/da.
<b>MEYVELER</b>		
Narenciye Portakal, Limon, Mandalin, Greyfurt vs. Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz	Sürgün faaliyeti başlayıp 2 hafta ara ile 2-3 uygulama yapılır.	300-400 gr/100lt.
Bağ	Gelişmenin erken döneminde çiçeklenmeden önce ilk meyve tutumundan sonra ikinci ve bundan 15 gün sonra 3. uygulama yapılır.	250-300 gr/100lt.
Çilek	Fide dikiminden itibaren 15-20 günlük aralıklarla 2-3 uygulama	350-400 gr/100lt.
Muz	Çiçeklenme döneminden başlayıp 7-10 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.	400-600 gr/100lt.
Zeytin	Yetiştirme süresi boyunca 3-4 uygulama yapılır.	300-400 gr/100lt.
Süs Bitkisi	İki haftada bir uygulama yapılır.	75-100gr/100lt.
Çimenler	Yaz dönemi boyunca ayda bir uygulama	100-150 gr/100lt.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

Kuvvetli alkaline ve bordo bulamacı dışındaki ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir. Çiçeklenme döneminde püskürtülerek yapılacak ilaçlama ve gübrelemenin zarar verme olasılığı göz önünde tutulmalıdır. Üretici firma ürünün yanlış kullanılmasından doğacak zarardan sorumlu değildir. Kullandıktan sonra elinizi yıkayınız. Göz ile temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Orijinal ambalajında 0 °C +40°C arasındaki sıcaklıkta güneş almayan kapalı ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Gübreleme işlemi güneş etkisinin az olduğu sabah erken ve akşam geç saatlerde yapılmalıdır. Yutmayınız, teneffüs etmeyiniz. Yutulması halinde doktora başvurunuz. Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.



Bakanlık Lisans No: Bakanlık Tescil No: Parti Seri No: Son Kullanım Tarihi:  
Üretim Tarihi: Ambalaj Ağırlığı:

**ÜRETİCİ FİRMA**  
**FERTİKİM TARIM KİMYA MAKİNE SAN. VE TİC A.Ş.**  
Cumhuriyet Mah. Kazım Karabekir Cad. No:53  
35170 Ulucak Kemalpaşa / İZMİR  
Tel: 0 232 873 46 64 Fax: 0 232 873 44 55  
[www.fertikim.com](http://www.fertikim.com) [info@fertikim.com](mailto:info@fertikim.com)

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısı olacağını taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz

**Sebahat ULUŞAN**  
Ziraat Mühendisi

**FERTİKİM**  
**TARIM KİMYA MAKİNE SAN. VE TİC.A.Ş.**  
Cumhuriyet Mah. Kazım Karabekir Cad. No:53  
Ulucak - Kemalpaşa / İZMİR  
Tel: (0 232) 873 46 64  
Kemalpaşa WD.385 015 3412