

# EC FERTILIZER CROSS

## Magnezyum Sülfat Çözeltisi



**GARANTİ EDİLEN İÇERİK % (w/w)**  
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) : % 5

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE UYGULAMA DOZLARI			
ÜRÜNLER	DOZU	ADEDİ	ZAMANI
Narenciye	500-600cc/100lt	2	İlk sürgün faaliyeti ve çiçeklenme sonrası bir uygulama
Bağ	350-400cc/100lt	2-3	Yapraklanma zamanı 1 dane tutumu zamanı 2 uygulama
Pamuk	150-200cc/da	1	Taraklanmadan önce bir uygulama
Sebzeler	250-300cc/da	2-3	Gelişme dönemi boyunca 2-3 uygulama
Meyve Ağaçları	450-500cc/100lt	2	Sürgün faaliyetinden sonra 2 hafta ara ile 2 uygulama
Patates	400-500cc/da	2-3	Çıkıştan hemen sonra hasada kadar 2-3 uygulama
Sera Ürünleri	400-450cc/da	3-4	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 2 haftada bir uygulama
Hıyar	400-500cc/da	1-2	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 2 haftada bir uygulama
Karpuz-Kavun	200-300cc/da	2	Çiçeklenmeden önce 2 uygulama
Tütün	200-300cc/da	2	Ekildikten ilk kırıma kadar 2 uygulama
Süs Bitkileri	300-350cc/da	-	İki haftada bir uygulama
Şeker Pancarı	400-500cc/da	2-3	Gelişme dönemi boyunca 2-3 uygulama
Zeytin	300-350cc/100lt	1-2	Çiçeklenmeden önce 1-2 uygulama
Çilek	300-400cc/da	1-2	Meyve tutumundan önce iki uygulama
Tarla Bitkileri	150-200cc/da	1	Kardeşlenme döneminde bir uygulama

### DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- ❖ Kuvvetli alkalın ve bordo bulamacı dışındaki ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir.
  - ❖ Çiçeklenme döneminde püskürtülerek yapılacak ilaçlama ve gübrelemenin zarar verme olasılığı göz önünde tutulmalıdır.
  - ❖ Üretici firma ürünün yanlış kullanılmasından doğacak zarardan sorumlu değildir.
  - ❖ Kullandıktan sonra elinizi yıkayınız.
  - ❖ Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.
  - ❖ Orijinal ambalajında ve kapağı kapalı olarak güvenli bir yerde saklayınız.
  - ❖ Gübreleme işlemi güneş etkisinin az olduğu sabah erken ve akşam geç saatlerde yapılmalıdır.
  - ❖ 0-+40 °C arasında depolayınız.
  - ❖ **Asla uygun doz oranını aşmayınız. Yalnızca gerekli yerlerde kullanınız.**
- Yaprak gübrelemesi ile ulaşılabilecek sonuçlar ve mahsul miktarı; toprak, iklim vb. gibi birden fazla faktör tarafından etkilenir. Bu sebeple önce yaprak ve toprak analizi yaptırılması elde edilen analiz sonuçlarına göre gübreleme yapılması önerilmektedir.

Bakanlık Tescil No :  
Bakanlık Lisans No : 078  
Son Kullanma Tarihi :  
Parti Seri No :  
Net : 500 Gr.(0.655 Kg.)- 1,31KG-6,55KG-26,20KG  
1 Lt. -5 Lt. -20 Lt.

#### İTHALATÇI FİRMA

FERTİKİM TARIM KİMYA SAN. TİC.A. Ş.  
Cumhuriyet Mah. Kâzım Karabekir Cad. No:53  
Ulucak Kemalpaşa / İZMİR  
Tel: 0232 8734664 Fax: 0232 8734455  
[www.fertikim.com](http://www.fertikim.com) e-mail: [info@fertikim.com](mailto:info@fertikim.com)

#### ÜRETİCİ FİRMA

MİCROMIX PLANT HEALTH LTD.  
Coachgap Lane Langar, Notts, NG13 9HP

Piyasaya Sunacağımız Ürün Üzerindeki Etiket Bilgisinin Aynısının Olacağını Taahhüt Eder Aksinin Tespiti Halinde 4703 Sayılı Kanuna Göre Hakkımızda Yapılacak Cezai İşlemleri Peşinen Kabul Ederiz.

**FERTİKİM**  
TARIM KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş.  
Cumhuriyet Mah. Kâzım Karabekir Cad. No:53  
Ulucak - Kemalpaşa / İZMİR  
Tel: (0 232) 873 4664  
Kemalpaşa / 02325 015 3412