

EC FERTİLİZER
NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ
NP-ZİNC
12-6-0 + ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİK		(w/w)	
Toplam Azot (N)	: % 12	Suda Çözünür Bakır (Cu)	: % 0.02
Üre Azotu (N)	: % 12	Suda Çözünür Demir (Fe)	: % 0.02
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	: % 6	Suda Çözünür Mangan (Mn)	: % 0.01
		Suda Çözünür Çinko (Zn)	: % 4

KULLANILDIĞI BİTKİLER ve YAPRAKTAN UYGULAMA DOZLARI			
ÜRÜNLER	DOZU	ADEDİ	ZAMANI
Pamuk	200-250 cc/da	1-2	Çiçekten 10 gün önce ve koza tutma döneminde
Bağ	200-250 cc/da	1-2	Yapraklanma ve dane tutumu zamanı
Narenciye	200-250 cc/da	2	İlkbahar sürgün faaliyeti ve meyve tutumu zamanı
Tütün	150-200 cc/da	1	Ekildikten iki hafta sonra bir uygulama
Sebzeler	150-200 cc/da	2	Çiçeklenmeden önce bitki gelişiminin erken dönemlerinde
Meyve Ağaçları	150-200 cc/da	2-3	Yapraklanma döneminden başlayarak iki haftada bir uygulama
Patates	200-250 cc/da	2-3	Çiçeklenme öncesinden itibaren 2 haftada bir uygulama
Hububat	150-250 cc/da	1	Sapa kalkma ve dane tutumu öncesi
Sera Ürünleri	200-250 cc/da	3-4	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren iki haftada bir uygulama
Zeytin	150-200 cc/da	1-2	Çiçeklenmeden önce bir, Meyve tutumunda bir uygulama
Karpuz	200-250 cc/da	1-2	Meyve tutumu döneminde iki uygulama
Çilek	200-250 cc/da	1-2	Meyve tutumundan önce iki uygulama

* NP-ZİNC çok yıllık bitkilerde düzenli olarak, tek yıllık bitkilerde çinko eksiklik belirtileri görülmeden erken dönemde kullanılmalıdır.

* Toprak uygulamalarında 750-1000 cc/da dozunda 2 uygulama yapılmalıdır.

* Yaprak gübrelemesi ile ulaşılabilecek sonuçlar ve mahsul miktarı; toprak, iklim vb. gibi birden fazla faktör tarafından etkilenir. Bu sebeple önce yaprak ve toprak analizi yaptırılması elde edilen analiz sonuçlarına göre gübreleme yapılması önerilmektedir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

* Kuvvetli alkalın ve bordo bulamacı dışındaki ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir.

* Üretici firma ürünün yanlış kullanılmasından doğacak zarardan sorumlu değildir.

* Kullandıktan sonra elinizi yıkayınız.

* Göz ile temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. **Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz**

* Orijinal ambalajında 0°C ile + 40 °C arasındaki sıcaklıkta güneş almayan kapalı ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

* Gübreleme işlemi güneş etkisinin az olduğu sabah erken ve akşam geç saatlerde yapılmalıdır.

* Yutmayınız, teneffüs etmeyiniz. Yutulması halinde doktora başvurunuz.

Bakanlık Lisans No ;

Parti Seri No :

Net Ağırlık :

Bakanlık Tescil No :

Son Kull. Tarihi :

Üretim Tarihi:


ÜRETİCİ FİRMA

FERTİKİM TARIM KİMYA SAN. VE TİC. AŞ.

Cumhuriyet Mah. Kazım Karabekir Cad. No53 Ulucak Kemalpaşa / İzmir

Tel 0232 873 46 64 Fax: 0232 873 44 55

e-mail.info@fertikim.com – www.fertikim.com



Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

FERTİKİM
TARIM KİMYA MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Kazım Karabekir Cad. No:53
Ulucak - Kemalpaşa / İZMİR
Tel: (0.232) 873 46 64
Kemalpaşa V.D.385 015 3412

Sebahat ULUŞAN