

27071

EC FERTİLİZER  
DEMİR ŞELATI - EDDHA

**FERROX 6**

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(w/w)
Suda Çözünür Demir (Fe)	: % 6
EDDHA ile Şelatlı Demir (Fe)	: % 6
EDDHA Şelatın stabil olduğu ph aralığı Demir (Fe)	: 4-9

**KULLANILDIĞI BİTKİLER VE UYGULAMA DOZLARI :**

Bitki Türü	Doz
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Şeftali, Narenciye, v.b.)	
Yeni dikilen ağaçlarda	10-20 gr./ağaç başına
Meyve tutumuna yakın ağaçlarda	20-50 gr./ağaç başına
Tam verim devresinde olan ağaçlarda	
(Şeftali, Elma, Armut, Narenciye v.s.) ve büyük ağaçlarda	75-150 gr./ağaç başına
Bağ	20-30 gr./omca başına
Sera ve açık sebzeler	300-500 gr./dekar

**KULLANIM ZAMANI:**

En iyi kullanım zamanı ilkbaharda bitkilerin uyanmaya başladığı dönemdir. Demir noksanlığı belirtisi beklenen meyve bahçeleri ve fidanlıklarda erken ilkbaharda, tomurcuk ve çiçeklerden açılmadan tatbik edilmelidir. Uygulama yapılacak toprak nemli olmalıdır. Uygulamadan 1 gün sonra sulama yapılmalıdır.

**KARIŞILIRLIĞI:**

Alkali reaksiyonlu ilaç ve gübrelerle karıştırılmamalıdır. Kullanılacak doz, bitkinin yaşına, toprak yapısına toprağın kireç ve pH sına ve noksanlığın göre artırılabilir. Geniş bir pH aralığında etkisini sürdürebilmektedir. pH aralığı 4 ile 9 arasında olan topraklarda rahatlıkla kullanılabilir.

**UYARILAR**

Kuvvetli alkalın ve bordo bulamacı dışındaki ilaçlarla ve gübrelerle karıştırılarak kullanılabilir.

Üretici firma ürünün yanlış kullanılmasından doğacak zarardan sorumlu değildir.

Göz ile temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.

Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.

Orijinal ambalajında 0°C /+40°C- arasındaki sıcaklıkta güneş almayan kapalı ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

Yutmayınız, teneffüs etmeyiniz. Yutulması halinde doktora başvurunuz.

Sadece tarım amaçlı ve gerekli yerlerde kullanınız.

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile, imalatçısı ürünün kalitesini garanti eder.

İmalatçı mamulün uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

Gübreleme ile ulaşılacak sonuçlar ve mahsul miktarı; toprak, iklim vb. gibi birden fazla faktör tarafından etkilenir. Bu sebeple önce yaprak ve toprak analizi yaptırılması elde edilen analiz sonuçlarına göre gübreleme yapılması önerilmektedir.

Toprak ve /veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

LİSANS NO	TESCİL NO	PARTİ/SERİ NO
ÜRETİM TARİHİ	SON KULLANMA TARİHİ	NET AĞIRLIK

**İTHALATÇI FİRMA**

FERTİKİM TARIM KİMYA MAK.SAN.VE TİC.A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Kâzımkarabekir Cad. No:53

Ulucak Kemalpaşa / İzmir

Tel: 0232 873 46 64 Fax: 0232 873 44 55

e-mail: info@fertikim.com- www.fertikim.com



13-04-2016

Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynısının olacağını taahhüt eder aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

**FERTİKİM**  
TARIM KİMYA MAK.SAN.VE TİC.A.Ş.  
Cumhuriyet Mah. Kâzımkarabekir Cad. No:53  
Ulucak Kemalpaşa / İZMİR  
Tel: (0.232) 873 46 64  
Kemalpaşa V.D.385 015 3412

Sebat ULUŞAN  
Ziraat Mühendisi