EC FERTILIZER

Bor (B), Bakır (Cu-Sülfat), Demir (Fe-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat), Molibden (Mo), Çinko (Zn-Sülfat)

MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

COMBIMIX

GARANTİ EDİLEN İÇERİK (% W/W)

Suda Çözünür Bor (B)	: % 1.5
Suda Çözünür Bakır (Cu)	: % 1
Suda Çözünür Demir (Fe)	: % 6
Suda Çözünür Mangan (Mn)	: % 4
Suda Çözünür Molibden (Mo)	: % 0.05
Suda Çözünür Çinko (Zn)	: % 7

BİDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ONAYLANMIŞTIR
12.04.2013

% 100 SOLUBLE

TAMAMI SUDA ÇÖZÜNÜR

MADE IN ENGLAND

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

** Kuvvetli alkalin ve bordo bulamacı dışındaki ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir.*

** Çiçeklenme döneminde püskürtülerek yapılacak ilaçlama ve gübrelemenin zarar verme olasılığı göz önünde tutulmalıdır.*

** Üretici firma ürünün yanlış kullanılmasından doğacak zarardan sorumlu değildir.*

** Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız.*

** Göz ile temasından kaçınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.*

** Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.*

** Orijinal ambalajında +40 C - 0 C arasındaki sıcaklıkta güneş almayan kapalı ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.*

** Gübreleme işleni güneş etkisinin az olduğu sabah erken ve akşam geç saatlerde yapılmalıdır.*

** Yutmayınız, teneffüs etmeyiniz.Yutulması halinde doktora başvurunuz.*

** İmalatçı mamulün uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.*

** Asla önerilen dozları aşmayınız.*

** Sadece tarım amaçlı ve gerekli yerlerde kullanınız.*

Yaprak gübrelemesi ile ulaşılacak sonuçlar ve mahsül miktarı; toprak, iklim vb. gibi birden fazla faktör tarafından etkilenir. Bu sebeple önce yaprak ve toprak analizi yaptırılması elde edilen analiz sonuçlarına göre gübreleme yapılması önerilmektedir.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI (YAPRAKTAN)

- Element eksikliği bekleniyor yada düşük seviyede ise : 40 - 60 gr/da veya 100 lt. Suya
- Element eksikliği net bir şekilde görülüyor ise : 80 -100 gr/da veya 100 lt. Suya
- Damlamadan 1000 lt. Sulama suyuna 100 - 150 gr. **COMBIMIX** dozuyla 15-20 gün aralıklar ile uygulanır.
- En iyi sonuç için bitkilerin aktif büyüme döneminde uygulayınız. Sıcak havalarda sabahın erken saatlerinde yada akşam üstü serinlikte püskürtünüz. Gün ortasında yapacağınız uygulama yüksek nem ve buharlaşma nedeni ile çok etkili olmayabilir.

KARIŞABİLME ÖZELLİĞİ: Alkali ilaçlar ve Bordo bulamacı (Bakır) hariç diğer ilaç ve gübreler ile karıştırılarak kullanılabilir. Birden fazla ilaç ile uygulanacaksa, ön karışım testi yapılmalıdır.

COMBIMIX KULLANILMASI TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER

Domates	Biber	Mısır	Pamuk	Üzüm
Fasulyeler	Karpuz	Çilek	Zeytin	Kiraz
Kavun	Şeftali	Elma	Armut	Erik
Kayısı	Kabak	Brokoli	Marul	Kereviz
Lahana	Patates	Ş.Pancarı	Soğan	Pirinç
Havuç	Buğday	Soya	Muz	Karnıbahar
Arpa	A.Fıstığı	Süs Bitkileri	Yonca	Fındık
Y.Fıstığı	Mercimek	Kanola	Bezelye	Ayçiçeği
Baklagiller	Salatalık	Narenciye	Patlıcan	

ÜRETİCİ FİRMA

Micromix Plant Health Ltd.,
Coachgap Lane, Langar,
Nottingham, NG13 9HP,
ENGLAND

İTHALATÇI FİRMA

FERTİKİM
TARIM KİMYA MAK. SAN. ve TİC. A.Ş.
Cumhuriyet Mh. Kazım Karabekir Cd. No:53
35170 Ulucak - Kemalpaşa - İZMİR
Tel: 0 232 873 46 64 Fax: 873 44 56
www.fertikim.com e-mail:info@fertikim.com

Piyasaya sunacağımız ürünün etiket bilgilerinin bilgisayar çıktısındaki bilgilerin aynısı olacağını taahhüt eder; aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

COMBIMIX

BAKANLIK TESCİL NO :
BAKANLIK LİSANS NO:
SERİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULL. TARİHİ :
AMBALAJ MİKTARI :

8 698845 150282

FERTİKİM
TARIM KİMYA MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Kazım Karabekir Cad. No:53
Ulucak - Kemalpaşa / İZMİR
Tel: (0.232) 873 46 64
Kemalpaşa V.D.385 015 3412

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi