

EC FERTİLİZER
NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ
UpH-60X
8-19-0 +ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİK %(W/W)			
Toplam Azot (N)	: % 8	Suda Çözünür Bakır (Cu)	: % 0.02
Üre Azotu (N)	: % 8	Suda Çözünür Demir (Fe)	: % 0.02
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5): % 19		Suda Çözünür Mangan (Mn)	: % 0.01
		Suda Çözünür Çinko (Zn)	: % 0.01

KULLANILDIĞI BİTKİLER ve YAPRAKTAN UYGULAMA DOZLARI			
ÜRÜNLER	DOZU	ADEDİ	UYGULAMA ZAMANI
Bağ	250-300 cc/100 Lt	—	Her Gibberellic Asit uygulamasında
Narenciye	250-300 cc /100 Lt	2	İlkbahar sürgün faaliyeti ve çiçeklenmeden önce bir uygulama
Pamuk	200-300 cc/ da	1	Çiçeklenmeden önce
Sebzeler	200-250 cc/ da	3-4	Gelişme dönemi boyunca
Meyve Ağaçları	250-300 cc/100 Lt	2-3	Sürgün faaliyeti ile birlikte iki haftada bir
Sera ürünleri	400-450 cc/ da	3-4	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren çiçeklenme dönemine kadar iki haftada bir
Tütün	250-300 cc/100 Lt	2	Ekildikten, ilk kırıma kadar
Zeytin	300-350 cc/100 Lt	1 -2	Çiçeklenmeden önce
Çilek	250-300 cc/ 100 Lt	1 -2	Meyve tutumundan önce
Tarla bitkileri	250-350 cc/ da	1	Sapa kalkma döneminde
Süs Bitkileri	200-300 cc/ 100 Lt	—	İki haftada bir
Karpuz	200-250 cc/ da	2	Çiçeklenmeden önce
Patates	200-250 cc/ da	1	Çiçeklenmeden önce

- * UpH-60X çok iyi bir tampon çözeltilidir, sert suların ve ilaçlama sularının Ph'sını düşürmek için rahatlıkla kullanılabilir.
- * UpH-60X . Gibberellic asit ve benzeri bitki büyüme düzenleyicilerinin etkisini arttırmak amacıyla kullanılan özel bir karışımdır.
- * UpH-60X , 100 Lt Gibberellic asit solüsyonuna 200-300 cc dozunda ilave edilerek bitkinin gelişme döneminde yaprağa püskürtülerek uygulanır.
- * UpH-60X'ın yapısında klor (Cl) bulunmaz. Dolayısıyla. Klora duyarlı bitkilerde güvenle kullanılabilir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- * Kuvvetli alkalın ve bordo bulamacı dışındaki ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir.
- * Üretici firma ürünün yanlış kullanılmasından doğacak zarardan sorumlu değildir. Kullandıktan sonra elinizi yıkayınız.
- * Göz ile temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.
- * Orijinal ambalajında 0°C ile + 40 °C arasındaki sıcaklıkta güneş almayan kapalı ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
- * Gübreleme işlemi güneş etkisinin az olduğu sabah erken ve akşam geç saatlerde yapılmalıdır.
- * Yutmayınız, tenneffüs etmeyiniz. Yutulması halinde doktora başvurunuz.

Bakanlık Lisans No :,

Parti Seri No :

Net Ağırlık:

Bakanlık Tescil No :

Son Kull. Tarihi :

Üretim Tarihi :

ÜRETİCİ FİRMA

FERTİKİM TARIM KİMYA SAN. VE TİC. AS.
Cumhuriyet Mah. Kazım Karabekir Cad. No53
Ulucak Kemalpaşa / İzmir
Tel 0232 873 46 64 Fax: 0232 873 44 55
e-mail.info@fertikim.com - www.fertikim.com



PİYASAYA SUNACAĞIMIZ ETİKET İLE AYNI OLACAĞINI TAAHHÜT EDER, AKSİNİN İSPATI HALİNDE 4703 SAYILI KANUNA GÖRE HAKKIMIZDA YAPILACAK CEZAI İŞLEMİ PEŞİNEN KABUL EDERİZ.

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi

FERTİKİM
TARIM KİMYA MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Kazım Karabekir Cad. No:53
Ulucak Kemalpaşa / İZMİR
Tel: 0232 873 46 64