

EC FERTILIZER  
**HIGH TECH TOLERANCE**

Bor(B), Bakır(Cu-Sülfat), Demir(Fe-Sülfat), Mangan(Mn-Sülfat), Molibden(Mo), Çinko(Zn-Sülfat)  
**MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI**

**GARANTİ İÇEREN İÇERİK (w/w)**

Suda Çözünür Bor (B)	: % 1,5
Suda Çözünür Bakır (Cu)	: % 1
Suda Çözünür Demir (Fe)	: % 6
Suda Çözünür Mangan (Mn)	: % 4
Suda Çözünür Molibden (Mo)	: % 0.05
Suda Çözünür Çinko (Zn)	: % 7



**UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI**

Element eksikliği yada düşük seviyede ise : 40-60 gr/da veya 100 lt. Suya(Yapraktan uygulama)

Element eksikliği net bir şekilde görülüyorsa : 80-100 gr/da veya 100 lt. Suya(yapraktan uygulama)

Damlamadan 1000 lt. Sulama suyuna 100-150 gr. Tolerance dozuyla 15-20 gün aralıklar ile uygulanır.

En iyi sonuç için bitkilerin aktif büyüme döneminde uygulayınız. Sıcak havalarda sabahın erken saatlerinde yada akşamüstü serinlikte uygulayınız. Gün ortasında yapacağınız uygulama yüksek nem ve buharlaşma nedeni ile çok etkili olmayabilir.

**KULLANILMASI TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER**

* Domates	* Biber	* Salatalık	* Narenciye	* Patlıcan
* Fasulyeler	* Pamuk	* Mısır	* Pamuk	* Uzum
* Kavun	* Karpuz	* Çilek	* Zeytin	* Kiraz
* Kayısı	* Şeftali	* Elma	* Armut	* Erik
* Lahana	* Kabak	* Brokoli	* Marul	* Kereviz
* Havuç	* Patates	* Ş. Pancarı	* Soğan	* Piriç
* Arpa	* Buğday	* Soya	* Muz	* Karnabahar
* Y.Fıstığı	* A. Fıstığı	* Süs Bitkileri	* Yonca	* Fındık
* Baklagiller	* Kanola	* Mercimek	* Bezelye	* Ayçiçeği

**KARIŞABİLME ÖZELLİĞİ:** Alkali ilaçlar ve Bordo bulamacı (Bakır) hariç diğer ilaç ve gübreler ile karıştırılarak kullanılabilir. Birden fazla ilaç ile uygulanacaksa, ön karışım testi yapılmalıdır

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- Kuvvetli alkalin ve bordo bulamacı dışındaki ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir.
- Çiçeklenme döneminde püskürtülerek yapılacak ilaçlama ve gübrelemenin zarar verme olasılığı göz önünde tutulmalıdır.
- Üretici firma ürünün yanlış kullanılmasından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk değildir.
- Kullandıktan sonra elinizi yıkayınız.
- Göz ile temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.
- Çocuklardan ve evcilik hayvanlardan uzak tutunuz.
- Orijinal ambalajında +40 C - 0 C arasındaki sıcaklıkta güneş almayan kapalı ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
- Gübreleme işlemi güneş etkisinin az olduğu sabah erken ve akşam geç saatlerde yapılmalıdır.
- Yutmayınız, teneffüs etmeyiniz. Yutulması halinde doktora başvurunuz.
- Asla önerilen dozları aşmayınız.
- Sadece tarım amaçlı ve gerekli yerlerde kullanınız.
- İmalatçı mamulün uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.
- Yaprak gübrelemesi ile ulaşılabilecek sonuçlar ve mahsul miktarı; toprak, iklim vb. gibi birden fazla faktör tarafından etkilenir. Bu sebeple önce yaprak ve toprak analizi yaptırılması elde edilen analiz sonuçlarına göre gübreleme yapılması önerilmektedir.

Bakanlık Tescil No

Bakanlık Lisans No

Parti No

Son Kull. Tarihi

Üretim Tarihi

Net Ağırlık:

**İTHALATÇI FİRMA**

FERTİKİM TARİM KİMYA MAK. SAN. VE TİC.A.Ş.  
Cumhuriyet Mah. Kazım Karabekir Cad. No:53  
35170 Ulucak Kemalpaşa / İZMİR  
Tel: 0232 873 46 64 Fax: 873 44 55  
e-mail: [info@fertikim.com](mailto:info@fertikim.com) [www.fertikim.com](http://www.fertikim.com)

**ÜRETİCİ FİRMA**

MANUFACTURED BY  
Micromix Plant Health Ltd  
Coachgap Lane, Langar Notts,  
NG13 9HP, United Kingdom

Piyasaya Sunacağımız Ürün Üzerindeki Etiket Bilgisinin Aynısının Olacağını Taahhüt Eder Aksinin Tespiti Halinde 4703 Sayılı Kanuna Göre Hakkımızda Yapılacak Cezai İşlemleri Peşinen Kabul Ederiz.

**FERTİKİM**  
TARİM KİMYA MAKİN. SAN. VE TİC.A.Ş.  
Cumhuriyet Mah. Kazım Karabekir Cad. No:53  
Ulucak - Kemalpaşa / İZMİR  
Tel: (0.232) 873 46 64  
Kemalpaşa V.D.385 015 3412

**Sebahat ULUŞAN**  
Ziraat Mühendisi