EC FERTILIZER
NPK GÜBRESİ (HARMANLANMIŞ)
ZEUS
3-5-25+(2 MgO)+ME

ARANTİ İÇEREN İÇERİK	% (w/w)
oplam Azot	: % 3
monyum Azotu(N)	: % 2
re Azotu(N)	: % 1
uda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P_2O_5)	: % 5
uda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	: % 25
uda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	: % 2
uda Çözünür Bor (B)	***:%0,2***
uda Çözünür Bakır (Cu)	***:%0,1***
uda Çözünür Demir (Fe)	:% 1
uda Çözünür Mangan (Mn)	:% 1,5
uda Çözünür Molibden (Mo)	***:%0,01***
uda Çözünür Çinko (Zn)	***:%4***

YGULAMA ŞEKLÎ VE DOZLARI(YAPRAKTAN UYGULAMA)

çeklenme öncesi ve hemen sonrasında olacak şekilde 80-100 gr/da veya 100 lt Suya
ı iyi sonuç için bitkilerin aktif büyüme döneminde uygulayınız. Sıcak havalarda sabahın erken saatlerinde yada akşam üstü serinlikte
gulayınız. Gün ortasında yapacağınız uygulama yüksek nem ve buharlaşma nedeni ile çok etkili olmayabilir.

ULLANILMASI TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER

omates	Biber	Salatalık	Narenciye	Patlıcan
asulye	Pamuk	Mısır	Pamuk	Üzüm
avun	Karpuz	Çilek	Zeytin	Kiraz
ayısı	Şeftali	Elma	Armut	Erik
ahana	Kabak	Brokoli	Marul	Kereviz
avuç	Patates	Ş.Pancari	Soğan	Pirinç
rpa	Buğday	Soya	Muz	Karnabahar
.Fıstığı	A. Fıstığı	Süs Bitkileri	Yonca	Fındık
aklagiller	Kanola	Mercimek	Bezelye	Ayçiçeği

08.04.2014

ARIŞABİLME ÖZELLİĞİ: Alkali ilaçlar ve Bordo bulamacı (Bakır) hariç diğer ilaç ve gübreler İle karıştırılarak kullanılabilir.
rden fazla ilaç ile uygulanacaksa, ön karışım testi yapılmalıdır.

İKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kuvvetli alkalin ve bordo bulamacı dışındaki ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir.
Çiçeklenme döneminde püskürtülerek yapılacak ilaçlama ve gübrelemenin zarar verme olasılığı göz önünde tutulmalıdır.
Üretici firma ürünün yanlış kullanılmasından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk değildir.
Kullandıktan sonra elinizi yıkayınız.
Göz île temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.
Çocuklardan ve evcik hayvanlardan uzak tutunuz.
Orijinal ambalajında +40 C - 9 C arasındaki sıcaklıkta güneş atmayan kapalı ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
Gübreleme işlemi güneş etkisinin az olduğu sabah erken ve akşam geç saatlerde yapılmalıdır.
Yutmayınız, teneffüs etmeyiniz. Yutulması halinde doktora başvurunuz.
Asla önerilen dozları aşmayınız.
Sadece tarım amaçlı ve gerekli yerlerde kullanınız.
malatçı mamulün uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul
mez.
Yaprak gübrelemesi İle ulaşılacak sonuçlar ve mahsul miktarı; toprak, iklim vb. gibi birden fazla faktör tarafından etkilenir. Bu sebeple
ce yaprak ve toprak analizi yaptırılması elde edilen analiz sonuçlarına göre gübreleme yapılması önerilmektedir.

akanlık Tescil No :
akanlık Lisans No :
Parti No
Son.Kullanma .Tarîhi
Net Ağırlık
Üretim Tarihi:

FERTİKİM
TARIM KİMYA MAKİNA SAN. VE TİC.A
Cumhuriyet Mah. Kazım Karabekir Cad. No
Ulucak / Kemalpaşa / İZMİR
Tel: (0.232) 873 46 64
Kemalpaşa V.D.385 015 3412

RETİCİ FİRMA:FERTİKİM TARIM KİMYA MAK, SAN. VE TİCA. Ş.
umhuriyet Malı. Kâzımkarabekir Cad. No:53 35170 Utacak Kemalpaşa /İZMİR
el: 0232 873 46 64 Fax: 873 44 55 e-mail: info@fertikitn.com - www.fcrtikim.com
yasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynısını olacağını taahhüt eder aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre
kkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi